

Nhân vi:

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Viên nang ANTESIK

Thành phần: mỗi viên nang có chứa

Berberin clorid 50 mg

Bột rễ mộc hương 200 mg

(*Radix saussureae lappae*)

Tá dược: Lactose, tinh bột sắn, talc, magnesi stearat vừa đủ 1 viên.

Công dụng: Antesik được phối hợp giữa các thành phần:

- Berberin là một kháng sinh có nguồn gốc thảo dược, có tác dụng diệt vi khuẩn gây bệnh đường ruột như viêm đại tràng, ỉa chảy, lỵ.

- Mộc hương: chủ trị các chứng khí trệ ở tỳ vị gây kém ăn, chướng bụng, tiêu chảy.

Chỉ định: Viêm đại tràng.

Chữa ỉa chảy, lỵ, rối loạn tiêu hóa.

Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với các thành phần của thuốc

- Phụ nữ có thai.

Tương tác thuốc: chưa có báo cáo.

Liều dùng và cách dùng:

Người lớn: 2 viên/lần x 2-3 lần/ngày

Trẻ em: 1/2 - 2 viên/lần x 2 lần/ngày

Tác dụng không mong muốn: hầu như không có, trong 1 số ít trường hợp có thể gây táo bón.

Chú ý:

Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải trong khi sử dụng thuốc

Người có thai và cho con bú: dùng thận trọng.

Người lái xe và vận hành máy móc: được dùng.

Quá liều và xử trí: Chưa có thông tin.

Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc quá hạn.

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS

Để thuốc xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc

CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX

358 Giải Phóng- Phương Liệt – Thanh Xuân- Hà Nội

Sản xuất tại: Nhà máy DP số 2

Trung Hậu- Tiền Phong – Mê Linh – Hà Nội



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ThS. Phùng Minh Dũng