

Decolgen®

ĐIỀU TRỊ CÁC DẤU HIỆU ĐẦU TIÊN CỦA CẢM
HẮT HƠI, SỐ MŨI, NHỨC ĐẦU



16/9/2016

ĐÃ CÓ VỊ 10 VIÊN



THÀNH PHẦN: **Decolgen Forte:** Paracetamol (Acetaminophen) 500mg, Phenylephrine Hydrochloride 10mg, Chlorpheniramine Maleate 2mg. **Decolgen ND:** Paracetamol (Acetaminophen) 500mg, Phenylephrine Hydrochloride 10mg. **CHỈ ĐỊNH:** Điều trị các triệu chứng cảm thông thường, viêm mũi dị ứng, viêm mũi vắn mạch, viêm màng nhầy xuất tiết do cảm, viêm xoang và các rối loạn của đường hô hấp trên. **LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG:** **Decolgen Forte:** (uống 3 hay 4 lần một ngày sau khi ăn): Người lớn: 1-2 viên/lần, tối đa 6 viên/24 giờ. Trẻ em: • 2-6 tuổi: ½ viên/lần, tối đa 1,5 viên/24 giờ; • 7-12 tuổi: ½ - 1 viên/lần, tối đa 3 viên/24 giờ. **Decolgen ND:** (uống 3 hay 4 lần một ngày): Người lớn: 1-2 viên/lần. Trẻ em: • 2-6 tuổi: ½ viên/lần; • 7-12 tuổi: ½ - 1 viên/lần. Không khuyến cáo dùng cho trẻ dưới 2 tuổi. Hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** **Decolgen Forte:** Không dùng với bệnh nhân: nhạy cảm với các thành phần của thuốc, suy gan, thận nặng, tăng huyết áp, hen cấp. **Decolgen ND:** Nhạy cảm với các thành phần của thuốc. Nghiện rượu. Suy gan hay thận nặng. Viêm gan tiến triển do vi rút. Paracetamol: người bệnh thiếu hụt glucose-6-phosphate dehydrogenase. Phenylephrine: không được dùng thuốc khi không có hướng dẫn của bác sĩ trong các trường hợp sau: bệnh tuyến giáp, đái tháo đường, cao huyết áp và các bệnh tim mạch khác, khó tiểu do phì đại tiền liệt tuyến. **THẬN TRỌNG:** **Decolgen Forte:** Cũng như các thuốc cường giao cảm khác, nên sử dụng thận trọng cho những bệnh nhân bị cường giáp, đái tháo đường, bệnh tim thiếu máu cục bộ. Paracetamol (acetaminophen) có liên quan với nguy cơ gây phản ứng da nghiêm trọng hiếm gặp. Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Stevens-Johnson (SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, và hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP). Khi phát hiện những dấu hiệu phát ban trên da đầu tiên hoặc bất kỳ dấu hiệu phản ứng quá mẫn cảm nào khác, bệnh nhân cần phải ngừng sử dụng thuốc. Ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc: thuốc này có thể gây kích thích thần kinh trung ương nhẹ, buồn ngủ. Nếu bị ảnh hưởng, người bệnh không nên lái xe hoặc vận hành máy móc. **Decolgen ND:** Paracetamol (acetaminophen): Cần thận trọng khi dùng paracetamol (acetaminophen) trong các trường hợp sau: bệnh phenylketon niệu, bệnh nhân đang sử dụng thuốc kháng đông uống, bệnh nhân đang uống rượu trong thời gian dài, suy thận nặng. Paracetamol (acetaminophen) tương đối không độc với liều điều trị. Đôi khi có những phản ứng da gồm ban dát, sẩn ngứa và mề đay. Các phản ứng mẫn cảm khác gồm phù thanh quản, phù mạch, và những phản ứng kiểu phản vệ có thể ít khi xảy ra. Giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu, và giảm toàn thể huyết cầu đã xảy ra với việc sử dụng những dẫn chất p-aminophenol, đặc biệt khi dùng kéo dài các liều lớn. Giảm bạch cầu trung tính và ban xuất huyết giảm tiểu cầu đã xảy ra khi dùng paracetamol. Hiếm gặp mất bạch cầu hạt ở người bệnh dùng paracetamol. Thận trọng với người suy giảm chức năng gan hoặc thận. Paracetamol (acetaminophen) có liên quan với nguy cơ gây phản ứng da nghiêm trọng hiếm gặp. Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Stevens-Johnson (SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, và hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP). Khi phát hiện những dấu hiệu phát ban trên da đầu tiên hoặc bất kỳ dấu hiệu phản ứng quá mẫn cảm nào khác, bệnh nhân cần phải ngừng sử dụng thuốc. Phenylephrine: Bệnh nhân nên ngưng thuốc có chứa phenylephrine và cần tư vấn với bác sĩ nếu triệu chứng kéo dài hơn 7 ngày; hay có các triệu chứng kèm theo như sốt cao, xuất hiện triệu chứng buồn nôn, chóng mặt, mất ngủ. Bệnh nhân cũng không nên dùng thuốc có chứa phenylephrine khi đang được điều trị hay vừa chấm dứt điều trị (trong 2 tuần) với thuốc ức chế MAO. **SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:** **Decolgen Forte:** Việc sử dụng thuốc an toàn trong khi mang thai chưa được chứng minh. Thuốc có thể đi vào sữa mẹ do đó không nên sử dụng cho những phụ nữ đang cho con bú do trẻ sơ sinh có thể quá nhạy cảm với tác động của thuốc. **Decolgen ND:** Phụ nữ có thai: sử dụng phenylephrine cho bệnh nhân ở giai đoạn cuối thai kỳ hay đang chuyển dạ có thể gây thiếu oxy và làm chậm nhịp tim cho thai nhi do tăng co bóp cơ tử cung và giảm tưới máu tử cung. Phụ nữ cho con bú: phenylephrine không thấy xuất hiện trong sữa mẹ, tuy nhiên nên cân trọng khi dùng cho phụ nữ cho con bú. **ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.** Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA. Số 16 VSIP II, Đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, ĐT: 08-39621000. Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Cục Quản lý Dược: ngày... tháng... năm.... Ngày in tài liệu: ngày... tháng... năm...

Tỉ lệ kích thước so với mẫu nẹp: 1:1; 1:2; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25