

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lần đầu: 04/3/2014

89/144

MẪU NHÃN SẢN PHẨM



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VTTT HẢI DƯƠNG
102 Chi Lăng P. Nguyễn Trãi - TP. Hải Dương * Tel: (0320) 3.853848

Thành Phần:

- Kem oxyd..... 4,5g
Bột Talc..... 7,5g
Glycerin..... vừa đủ 30g
Nước cất.....
Chỉ Định: Trị viêm da, làm dịu da;
Điều trị hỗ trợ chàm (eczema).
Chống Chỉ Định: Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc; Tổn thương da bị nhiễm khuẩn.

Hỗn Dịch Dung Ngoài

HỖ NƯỚC

30g

GM-P-WHO

SBK:

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
trước khi dùng

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

Liều Dùng - Cách Dùng:

- Vệ sinh sạch chỗ da bị bệnh, sau đó bôi thuốc lên.
- Ngày bôi 2 - 3 lần.

* **Chú ý:** Lắc kỹ trước khi dùng

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS

Số lô sx:
Ngày sx:
HD:

MẪU NHÃN SẢN PHẨM



Thành Phần:

Kem oxyd.....
Bột Talc.....
Glycerin.....
Nước cất.....
Chỉ Định: Trị viêm da, làm dịu da;
Điều trị hỗ trợ chàm (eczema).
Chống Chỉ Định: Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc; Tổn thương da bị nhiễm khuẩn.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VĨ DƯƠNG
102 Chi Lăng P. Nguyễn Trãi - TP. Hải Dương * Tel: (0320)3.853848

Hỗn Dịch Dung Ngoại

HỖ NƯỚC

20g

GMP-WHO

SBK:

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
trước khi dùng

KHÔNG ĐƯỢC UỐNG

Liều Dùng - Cách Dùng:

- Vệ sinh sạch chỗ da bị bệnh, sau đó bôi thuốc lên.
- Ngày bôi 2 - 3 lần.

* **Chú ý:** Lắc kỹ trước khi dùng

Bảo quản: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Tiêu chuẩn: TCCS

Số lô sx:

Ngày sx:

HD:

Handwritten signature

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỒ NƯỚC

Dạng bào chế: Hỗn dịch dùng ngoài.

Thành phần:

	Lọ 20g	Lọ 30g
Kẽm oxyd	3,0 g	4,5g
Bột Talc	3,0 g	4,5g
Glycerin	5,0 g	7,5g
Nước tinh khiết	vừa đủ 20 g	vừa đủ 30 g

Được lực học:

Kẽm oxyd có tính chất làm săn da và sát khuẩn nhẹ và được dùng bôi tại chỗ để bảo vệ, làm dịu tổn thương chàm (eczema) và các chỗ trợt da nhẹ.

Được động học:

Thuốc dùng ngoài da, không hoặc rất ít hấp thu vào tuần hoàn chung.

Chỉ định:

- Trị viêm da, làm dịu da.
- Điều trị hỗ trợ chàm (eczema).

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
Tổn thương da bị nhiễm khuẩn.

Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Liều dùng - Cách dùng:

- Vệ sinh sạch chỗ da bị bệnh, sau đó bôi thuốc lên.
- Ngày bôi 2 - 3 lần.

Thận trọng

Trước khi bôi thuốc và trong quá trình điều trị phải vệ sinh sạch vùng được bôi thuốc vì có thể bội nhiễm ở các vùng bị thuốc che phủ.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc không ảnh hưởng tới người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc dùng được cho phụ nữ có thai và đang cho con bú.

Tương tác với các thuốc khác: Không có.

Quá liều và xử trí : Chưa có báo cáo.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất .

Bảo quản : Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng

Tiêu chuẩn chất lượng : TCCS

Quy cách đóng gói : Lọ 20g, lọ 30g.

Chú ý: - Lắc kỹ trước khi dùng

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

- Để xa tầm tay trẻ em. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VITYT HẢI DƯƠNG

102 Chi Lăng TP Hải Dương

ĐT/ Fax : 0320.853848

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Toanh